

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep dasar asuhan kebidanan pada Ny. I dengan pre-eklampsia ringan dan asuhan normal pada By. Ny. I
2. Dari data subjektif dan data objektif didapatkan pada kasus sesuai dengan keluhan dan hasil pemeriksaan. Pada Ny. I dengan keluhan edema dan merasa cemas karena belum ada tanda-tanda persalinan setelah HPL lewat 3 hari, dari hasil pemeriksaan didapatkan TD 140/90 mmHg, N 84 x/m, RR 20 x/m, S 36.5^oC, terdapat edema pada wajah, ekstremitas atas dan bawah serta hasil laboratorium protein urine +1.
3. Analisa pada kasus Ny. I setelah dilakukan pemeriksaan data subjektif dan data objektif di dapat selama melakukan asuhan, bahwa pasien mengalami pre-eklampsia ringan.
4. Penatalaksanaan kasus Ny. I dengan pre-eklampsia ringan dilakukan tindakan yaitu pasien dirawat inap di rumah sakit dan diberikan terapy MgSO₄ secara IV drip RL dan diberikan induksi gastrul pervaginam. Setelah dilakukan observasi tidak ada tanda-tanda kemajuan persalinan dan induksi gagal. Dokter menyarankan untuk di operasi *sectio caesarea*.
5. Dari teori dan hasil penelitian yang telah di bahas tidak ada kesenjangan asuhan kebidanan yang diberikan pada Ny. I dengan pre-eklampsia ringan.

B. Saran

1. Bagi Puskesmas

Di harapkan bagi tenaga kesehatan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan pre-eklampsia ringan sesuai dengan manajemen kebidanan.

2. Bagi ibu dan keluarga

Di harapkan bagi ibu dan keluarga dapat lebih memperhatikan dan memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan agar lebih terkontrol dan dapat di deteksi secara dini masalah yang kemungkinan terjadi